

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย

ติดสังคม

[illegible]

จำแนกกลุ่มผู้ป่วย ได้ประยุกต์เกณฑ์การประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันดัชนีบาร์

เชลเอดี้แอล (Barthel ADL index) ซึ่งมีคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ดังนี้

ผู้ป่วยกลุ่ม ๑ ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้ มีผลรวมคะแนน ADL ตั้งแต่ ๑๒ คะแนนขึ้นไป

ผู้ป่วยกลุ่ม ๒ ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง มีผลรวมคะแนน ADL อยู่ในช่วง ๕-๑๑ คะแนน

ผู้ป่วยกลุ่ม ๓ ผู้ป่วยที่ดูแลตัวเองไม่ได้ ช่วยเหลือตัวไม่ได้ พิกการ หรือทุพพลภาพ (ติดเตียง) มี

ผลรวมคะแนน ADL อยู่ในช่วง ๐-๕ คะแนน

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย

ติดเตียง

[illegible]

จำแนกกลุ่มผู้ป่วย ได้ประยุกต์เกณฑ์การประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) ซึ่งมีคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ดังนี้

ผู้ป่วยกลุ่ม ๑ ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้ มีผลรวมคะแนน ADL ตั้งแต่ ๑๒ คะแนนขึ้นไป

ผู้ป่วยกลุ่ม ๒ ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง มีผลรวมคะแนน ADL อยู่ในช่วง ๕-๑๑ คะแนน

ผู้ป่วยกลุ่ม ๓ ผู้ป่วยที่ดูแลตัวเองไม่ได้ ช่วยเหลือตัวไม่ได้ พิกการ หรือทุพพลภาพ (ติดเตียง) มี
ผลรวมคะแนน ADL อยู่ในช่วง ๐-๔ คะแนน

ติดบ้าน

[illegible]

เชลเอดี้แอล (Barthel ADL index) ซึ่งมีคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ดังนี้

ผู้ป่วยกลุ่ม ๒ ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง มีผลรวมคะแนน ADL อยู่ในช่วง ๕-๑๑ คะแนน

ผู้ป่วยกลุ่ม ๓ ผู้ป่วยที่ดูแลตัวเองไม่ได้ ช่วยเหลือตัวไม่ได้ พิกการ หรือทุพพลภาพ (ติดเตียง) มี

ผลรวมคะแนน ADL อยู่ในช่วง ๐-๕ คะแนน